


**RECOMMANDATIONS : PRELEVEMENT  
URO-GENITAL CHEZ L'HOMME  
O-PRE-DS 075 version 1**



Cet examen permet de faire le diagnostic d'une infection uro-génitale chez l'homme

- ♦ Ne pas uriner **dans les 2 heures** précédant le prélèvement.
- ♦ Eviter toute toilette intime, tout traitement local (crème, gels, savons...)

**i** Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique (> 15 jours pour les chlamydiae, > 5 jours pour les germes banals).

**RECOMMANDATIONS : PRELEVEMENT  
URO-GENITAL CHEZ L'HOMME  
O-PRE-DS 075 version 1**



Cet examen permet de faire le diagnostic d'une infection uro-génitale chez l'homme

- ♦ Ne pas uriner **dans les 2 heures** précédant le prélèvement.
- ♦ Eviter toute toilette intime, tout traitement local (crème, gels, savons...)

**i** Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique (> 15 jours pour les chlamydiae, > 5 jours pour les germes banals).

**RECOMMANDATIONS : PRELEVEMENT  
URO-GENITAL CHEZ L'HOMME  
O-PRE-DS 075 version 1**



Cet examen permet de faire le diagnostic d'une infection uro-génitale chez l'homme

- ♦ Ne pas uriner **dans les 2 heures** précédant le prélèvement.
- ♦ Eviter toute toilette intime, tout traitement local (crème, gels, savons...)

**i** Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique (> 15 jours pour les chlamydiae, > 5 jours pour les germes banals).

**RECOMMANDATIONS : PRELEVEMENT  
URO-GENITAL CHEZ L'HOMME  
O-PRE-DS 075 version 1**



Cet examen permet de faire le diagnostic d'une infection uro-génitale chez l'homme

- ♦ Ne pas uriner **dans les 2 heures** précédant le prélèvement.
- ♦ Eviter toute toilette intime, tout traitement local (crème, gels, savons...)

**i** Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique (> 15 jours pour les chlamydiae, > 5 jours pour les germes banals).