

RECOMMANDATIONS : TEST RESPIRATOIRE A L'UREE
O-PRE-ENR 47 version 3

Révision sans modification



Cet examen permet de rechercher *Helicobacter pylori*, bactérie responsable d'affections gastro-duodénales.

Prévoir un délai de 30 minutes pour le prélèvement

Précautions à prendre avant le prélèvement :

- Venir impérativement à jeûn sans boire ni manger ni fumer
- Arrêt de tout antibiotique au moins 4 semaines avant (Pylera*, ...)
- Arrêt des anti-sécrétoires depuis au moins 2 semaines
- Arrêt depuis 24 h des pansements gastriques

Anti-sécrétoires à éviter :

- IPP : Omeprazole*, Pariet*, Inipomp*, Mopral*, Zoltum*, Lanzor*, Inexium*, etc
- Anti-H2: Stomedine*, Tagamet*, Pepdine*, Azantac*, Raniplex*, etc
- Cytotec*, Keal*, Ulcar*

En cas de doute, veuillez vous rapprocher du secrétariat du laboratoire



Date d'application : 18-09-2019
Approuvé par : Dr Laurent KUPERWASER

p 1/1

RECOMMANDATIONS : TEST RESPIRATOIRE A L'UREE
O-PRE-ENR 47 version 3

Révision sans modification



Cet examen permet de rechercher *Helicobacter pylori*, bactérie responsable d'affections gastro-duodénales.

Prévoir un délai de 30 minutes pour le prélèvement

Précautions à prendre avant le prélèvement :

- Venir impérativement à jeûn sans boire ni manger ni fumer
- Arrêt de tout antibiotique au moins 4 semaines avant (Pylera*, ...)
- Arrêt des anti-sécrétoires depuis au moins 2 semaines
- Arrêt depuis 24 h des pansements gastriques

Anti-sécrétoires à éviter :

- IPP : Omeprazole*, Pariet*, Inipomp*, Mopral*, Zoltum*, Lanzor*, Inexium*, etc
- Anti-H2 : Stomedine*, Tagamet*, Pepdine*, Azantac*, Raniplex*, etc
- Cytotec*, Keal*, Ulcar*

En cas de doute, veuillez vous rapprocher du secrétariat du laboratoire



Date d'application : 18-09-2019
Approuvé par : Dr Laurent KUPERWASER

p 1/1